

FAO GUP	NOME COMERCIAL	BARROSO (Gulper shark)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Centrophorus granulosus</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Chordata	
		Classe	Chondrichthyes	
		Ordem	Squaliformes	
Família		Centrophoridae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie bentónica que pode ser encontrada na vertente continental entre os 350 e 500m. Peixe cartilágneo que se alimenta de outros peixes e cefalópodes. Pode atingir os 150 cm de comprimento. Corpo cilíndrico. Focinho curto. Dentes superiores triangulares, pontiagudos, mais pequenos que os dentes inferiores, com cúspide fortemente oblíqua e bordos serrilhados. Barbatanas dorsais com espinhos fortes. A 2ª barbatana dorsal mais pequena e baixa que a 1ª. Barbatanas pélvicas longas e pontiagudas na extremidade posterior. Barbatana anal ausente. Coloração violácea (nos adultos); ventre acinzentado e extremidades das barbatanas brancas (nos juvenis).

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	-
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27); Atlântico Centro-Este (Zona FAO 31); Mar Mediterrâneo (Zona FAO 37); Oceano Índico (Zona FAO 51, 57); Oceano Pacífico (Zona FAO 71)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de Arrasto e Palangre
MODO DE APRESENTAÇÃO	Pescado fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007); Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral
OBSERVAÇÕES	Pode ser seco ao sol, salgado, processado para farinha de peixe e utilizado para extração de óleo a partir do fígado. Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: Fishbase, Ictioterm, Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), Biodiversidade nas Pescas do Algarve (2007), DGRM.