

FAO JDP	NOME COMERCIAL	RATÃO (Common stingray)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Dasyatis pastinaca</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Cordados	
		Classe	Chondrichthyes	
		Ordem	Rajiformes	
Família		Dasyatidae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie bentónica que ocorre na zona costeira e, por vezes, pode nadar à superfície. Espécie ovovivípara. Alimenta-se de crustáceos e moluscos. Pode atingir 2,5m de comprimento.

Corpo achatado dorso-ventralmente. Cauda muito longa, com espinho venenoso de bordo serrilhado. Face dorsal com prega longitudinal. Fundos móveis infra e circalitorais. Coloração cinzento uniforme ou acastanhado no dorso.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	-
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27) Mar Mediterrâneo (Zona FAO 37)
MÉTODO DE CAPTURA	Redes de emalhar e de arrasto, Palangre
MODO DE APRESENTAÇÃO	Pescado fresco e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) nº 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) nº 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (CE) nº 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura
PÚBLICO-ALVO	População geral
OBSERVAÇÕES	Espécie da Lista Vermelha IUCN – Falta de informação para considerar o risco (DD) http://www.iucnredlist.org/details/161453/0

 Fonte: *Multilingual & Illustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), DGAV, DGRM, IUCN.