

FAO LIO	NOME COMERCIAL	NAVALHEIRA (Velvet swimcrab)		
	NOME CIENTÍFICO	<i>Necora puber</i>		
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Arthropoda	
		Classe	Malacostraca	
		Ordem	Decapoda	
Família		Polybiidae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie agressiva. Habita fundos arenosos e rochosos de águas pouco profundas. Reproduz-se de Janeiro a julho, sendo o seu pico mais acentuado na Primavera. Alimenta-se de algas-castanhas, bivalves e crustáceos. O último par de patas apresenta segmentos achatados em forma de pagaia e as fêmeas estão ovadas durante todo o ano. Coloração: olhos vermelhos; Carapaça achatada de cor avermelhada com zonas azuis, coberta de pelos densos de cor acastanhada e curtos (de onde vem a designação “*puber*”).

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	5 cm
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Rede de emalhar, Armadilhas e Marisqueiro
MODO DE APRESENTAÇÃO	Vivo e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) n.º 1441/2007) / Critérios químicos: Reg. (CE) n.º 1881/2006
ROTULAGEM	Informação constante na fatura: espécie, peso, grau de frescura, tamanho, modo de apresentação.
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a crustáceos
OBSERVAÇÕES	Época de defeso: 15 de fevereiro a 15 de junho (por apanha) Época de defeso por armadilha de gaiola (8-29mm): Entre janeiro e abril. Não foi encontrada informação nutricional relativa a esta espécie.

Fonte: *Multilingual & Illustrated Dictionary of Fish and Shellfish*, Guia para Identificação do Pescado de Portugal (INIP), Guia do Consumidor de Pescado (Vale do Bispo), DGAV, DGRM, Mar de Portugal (Ciência Viva).