

FAO EQ1	NOME COMERCIAL	LONGUEIRÃO-DIREITO (Sword razor shell)	
	NOME CIENTÍFICO	<i>Ensis siliqua</i>	
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Mollusca
		Classe	Bivalvia
		Ordem	Adapedonta
Família	Pharidae		



Fonte: www.ictioterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie que ocorre no infralitoral (zona das marés), em fundos arenosos ou arenosavosos. Alimenta-se de matéria em suspensão e fitoplâncton através de filtração.

De concha direita, sem sulco transversal próximo do bordo anterior (ao contrário do longueirão). Cor acastanhada, com zonas violáceas.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA	10 cm
ORIGEM	Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)
MÉTODO DE CAPTURA	Apanha à mão
MODO DE APRESENTAÇÃO	Vivo e inteiro
ACONDICIONAMENTO	Dornas ou em material de plástico
CONSERVAÇÃO	0 – 4°C
UTILIZAÇÃO PREVISTA	Cozinhado
CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS (quando aplicáveis)	Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações (Reg. (CE) n.º 1441/2007) Critérios químicos: Reg. (UE) n.º 2023/915
ROTULAGEM	Informação constante na fatura: espécie, peso, grau de frescura, tamanho, modo de apresentação.
PÚBLICO-ALVO	População geral com exceção de indivíduos com alergia ou intolerância a moluscos.
OBSERVAÇÕES	-

Fonte: World Register of Marine Species (Worms); Saldanha, L. (1997). Fauna submarina atlântica. 3.ª ed, Publicações Europa-América, Lda. Mem Martins.; DGRM, Ictioterm.