

FAO BLB	NOME COMERCIAL	PAMPO (Blue butterfish)	
	NOME CIENTÍFICO	<i>Stromateus fiatola</i>	
	CLASSIFICAÇÃO	Filo	Chordata
		Classe	Teleostei
		Ordem	Scombriformes
Família		Stromateidae	



Fonte: www.ictiorterm.es

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Espécie bentopelágica que ocorre entre os 10 e os 70 metros de profundidade. Formam cardumes e alimentam-se de pequenos peixes, zooplâncton e medusas.

De corpo ovóide e comprimido, com boca pequena e sem barbatanas ventrais nos indivíduos com mais de 10cm. Coloração azulada a acastanhada no dorso, prateada no ventre e com numerosas manchas irregulares e douradas, dispostas longitudinalmente.

TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA

-

ORIGEM

Atlântico Nordeste (Zona FAO 27)

MÉTODO DE CAPTURA

Palangre e Anzol.

MODO DE APRESENTAÇÃO

Fresco e inteiro

ACONDICIONAMENTO

Dornas ou em material de plástico

CONSERVAÇÃO

0 – 4°C

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Cozinhado

**CRITÉRIOS MICROBIOLÓGICOS OU QUÍMICOS
(quando aplicáveis)**Critérios microbiológicos: Reg. (CE) n.º 2073/2005 e alterações
(Reg. (CE) n.º 1441/2007)

Critérios químicos: Reg. (UE) n.º 2023/915

ROTULAGEMInformação constante na fatura: espécie, peso, grau de frescura,
tamanho, modo de apresentação.**PÚBLICO-ALVO**População geral com exceção de indivíduos com alergia ou
intolerância a peixes.**OBSERVAÇÕES**Espécie da Lista Vermelha IUCN – Menor preocupação
<https://www.iucnredlist.org/ja/species/198715/45879800>

Fonte: World Register of Marine Species (Worms); Manual Prático De Identificação de Peixes Ósseos da Costa Continental Portuguesa – IPMA (2015); Cardona L, Álvarez de Quevedo I, Borrell A, Aguilar A (2012) Massive Consumption of Gelatinous Plankton by Mediterranean Apex Predators. PLoSONE 7(3): e31329. doi:10.1371/journal.pone.0031329. ; DGRM, Ictiorterm.